




Piano Regolatore Generale Comunale

Rete Ecologica

Intero territorio scala 1:10.000

**AMMINISTRAZIONE DI
FIUMICELLO VILLA VICENTINA**
Sindaco
Dijust Alessandro
Assessore Pianificazione Territoriale
Marco Ustul

AREA TECNICA
URBANISTICA E AMBIENTALE
Responsabile
Ing. Marzia Decortis

PROGETTISTA, VAS E VINCA
Pian. Gianluca Ram
collaborazione VAS e VINCA
Pian. Gabriele Velcio
ASPETTI ARCHEOLOGICI
Archeologo Claudio Cotrufr

**Adeguato al VERBALE
CONFERENZA DI
SERVIZI
22/02/2024**

Adozione
DCC

Approvazione
DCC.....

OTTOBRE 2026

ELEMENTI SIGNIFICATIVI PER LA REL

01 - Lago di S. Antonio e corso della Mondina adiacente, per tale ambito e per i suoi dintorni si sviluppa una zona umida relativamente grande che comprende uno specchio d'acqua circondato da vegetazione arborea ripariale costituito anche dal corso del Mondina che in tale ambito si allarga; dal punto di vista vegetazione è presente il canneto a *Phragmites australis* (da tutelare).

02 - si individua un "bojon" a valle di Borgo Sandrigo trattasi di una piccola zona umida ancora esistente anche se fortemente compressa dall'agricoltura intensiva e a rischio per tale attività.

03 – Area individuata come sito riproduttivo del Saltimpalo Saxicola torquatus (oggetto di molteplici avvistamenti) tra la località di Belfior e Crocara; la specie si riproduce nei fossi e nella rete irrigua lungo la viabilità poiché il mantenimento imperfetto degli stessi permette il mantenimento di piccoli arbusti ed erba alta.

04 – Vi è la presenza della Roggia della chiesa che si manifesta come esempio particolare di corso d'acqua con i meandri tipici e sulle sponde presenza di vari Ontani neri - *Alnus glutinosa*; è presente anche la zona umida di ridotte dimensioni coincidente con il “bojon” della roia della chiesa.

05 – Presenza di un boschetto di frassini ossifilli *Fraxinus angustifolia* lungo un tratto del canale Morto.

06 – presenza del Bojón del Pizzin e relativa confluenza tra la Roggia Mondina, il canale Morto e la roggia Riuzzo con la risorgiva al centro dello specchio d'roggia Riuzzo e risorgiva al centro dello specchio acqueo; vi è la presenza di interessante flora ripariale con presenza di fauna acquatica e avifauna (presenza di alternanza tra boschetti, vegetazione e prati sfalcati).

07 – Tracciato di una Roggia con fondo ghiaioso ove vi è la presenza di gambero di fiume *Austropotamobius pallipes* e panzarolo *Knipowitschia punctatissima*.

08 – Presenza di porzioni di prato fiancheggiato da quinte arboree e trincee con vegetazione arbustiva e arborea.

09 - Presenza di porzioni di prato fiancheggiato da quinte arboree e trincee con vegetazione arbustiva e arborea.

10 – Presenza di una porzione boschiva golenale ove sono rilevate molteplici Farnie Quercus robur, inoltre è presente l'alveo della Mondina Vecchia ove vi sono Ontani Neri Alnus glutinosa e farnie Quercus robur, il sito si presenta ad elevata qualità ecologica e naturalistica per l'alternanza di vegetazione arborea ed arbustiva, per prati e per la rete irrigua.

11 – è presente un esemplare di Pioppo nero *Populus nigra* identificato come Albero Notevole inoltre nel vicino bosco golenale (in parte zona soggetta ad allagamenti) vi è la presenza di un bosco pianiziale (costituito da nocciolo *Corylus avellana*, pallon di maggio *Viburnum opulus*, farnia *Quercus robur*, ontano nero *Alnus glutinosa*, prugnolo *Prunus spinosa*, acero campestre *Acer campestre*) e specie ornamentali nidificanti di pregio quali gufo comune *Asio otus* e sparviere *Accipiter nisus*; immediatamente a valle esiste uno slargo dell'insonato con lembi di canneto e molte specie ornitiche acquatiche localmente rare (ad esempio fisionote turco *Natala rufina*).

12 – In questa zona si sviluppano elementi di prato umido lungo il corso del Fiume Tiel ove sono presenti anche esemplari di frassino ossifillo *Fraxinus angustifolia*.

13 - Lungo il corso del Tiel stesso sono presenti ampie fasce a canneto ospitanti molte coppie nidificanti di cannaieccione *Acrocephalus arundinaceus*, cannaiola *Acrocephalus scirpaceus* e lo svernamento dell'alzavola *Anas crecca*; inoltre un tratto della sponda sinistra ospita un boschetto a Frassino ossifillo *Fraxinus angustifolia* con presenza abbondante di Bucaneve *Galanthus nivalis*.

14 – Qui si sviluppa il canale di bonifica con importante popolamento di Campanellino maggiore *Leucium aestivum*.

15 – Lungo il corso dell'Isonzo, a valle della località di Palazzato, si presentano delle sponde caratterizzate dalla presenza del canneto a *Phragmites australis* e ospitanti specie come il cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*, cannaiola *Acrocephalus scirpaceus* e probabilmente il tarabusino *Ixobrychus minutus*.