



BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 3

Periodo: 25/08 – 31/08


Fase fenologica attuale (vite da tavola):

Fenofase: (BBCH 91 – 89 PRECOCI) - (BBCH 85 TARDIVE)

Elaborazione su base DSS *Agrigenius® Uva* (BASF)

A cura dell'Ufficio Tecnico Agriproject Group


FASE FENOLOGICA

									
Apertura gemme	Foglie distese	Grappoli separati	Bottoni fiorali separati	Fioritura	Allegagione	Pre chiusura grappolo	Chiusura grappolo	Maturazione acini	Raccolta

VARIETA' PRECOCI										
VARIETA' TARDIVE										

ZONE E VARIETA' DI RIFERIMENTO

- **Stazione meteo 1**
Località «Schiamante»
NOTA: 1.5 km dal mare
Varietà: precoce
- **Stazione meteo 2**
Località «Lipruni»
NOTA: 3.2 km dal mare
Varietà: precoce
- **Stazione meteo 3**
Località «Incoronata»
NOTA: 9.2 km dal mare
Varietà: tardiva



SITUAZIONE COMPLESSIVA

PERONOSPORA (*Plasmopara viticola*)

Per questa settimana, il modello Agrigenius® Uva non pronostica nessun rischio infettivo. Le bagnature mattutine possono far partire infezioni che rimangono confinate alla sola foglia o vegetazione esterna al vigneto.

OIDIO (*Erysiphe necator*)

Per la settimana in oggetto il DSS prevede rischio infettivo medio di infezioni secondarie sia per l'areale precoce che per quello tardivo. Tale rischio riguarda principalmente il rachide e gli organi verdi mentre per le bacche è ormai escluso vista la fase fenologica corrente. Il consiglio tecnico rimane sempre quello di valutare le condizioni meteorologiche, le caratteristiche specifiche del proprio vigneto e della zona tenendo conto che le condizioni microclimatiche che si vengono a creare nei vigneti coperti, con un'elevata umidità relativa e un'elevata escursione termica di/notte rappresentano un ambiente ottimale per lo sviluppo del fungo. Tuttavia la pericolosità della malattia non si esclude anche in vigneti sotto rete. I conidi, responsabili delle infezioni secondarie, sono capaci di infettare in un ampio range di temperatura e umidità, mentre la pioggia tende a limitarne l'attività.

BOTRITE (*Botrytis cinerea*)

Al momento il modello Agrigenius® Uva non prevede nessun rischio infettivo sia per l'areale precoce che per quello tardivo.

SITUAZIONE COMPLESSIVA

TIGNOLETTA (*Lobesia botrana*)


Negli areali monitorati, precoci e tardivi, il modello indica raggiungimento del picco di sviluppo delle larve e diminuzione del volo degli adulti e delle ovideposizioni. Contestualizzare il dato di popolazione prevista dal modello con il corretto monitoraggio di campo.

COCCINIGLIE (*Planococcus ficus*)

Nella settimana in oggetto, negli areali tardivi e precoci, il modello prevede l'incremento degli adulti e la diminuzione delle forme giovanili.

LOCALITÀ 1: Schiamante - Varietà precoce


PERONOSPORA



Per la settimana in oggetto il modello **Agrigenius® Uva** non prevede alcun rischio infettivo. Prestare attenzione alle eventuali bagnature mattutine che possono avviare cicli infettivi.

LOCALITÀ 1: Schiamante - Varietà precoce

OIDIO



Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** segnala rischio **medio** di **infezioni secondarie**. Tale rischio è riferito principalmente al **rachide** e agli **organi verdi**; le bacche hanno perso la suscettibilità al patogeno dall'invaiaatura.


OIDIO

Per il periodo considerato, nei vigneti di varietà precoci, il livello di **pressione infettiva** è **medio** a livello dei **grappoli invaiati/maturi**. Il rischio non decade per gli **organi verdi**, compreso il **rachide**, per i quali la **pressione infettiva** si mantiene su livelli **medio-alti**.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 1: Schiamante - Varietà precoce

BOTRITE




Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** non segnala alcun **rischio infettivo**.

TIGNOLETTA

LOCALITÀ 1 Schiamante - Varietà precoce

3° generazione - Popolazione presente (%)




Per la settimana in oggetto il modello previsionale indica il raggiungimento del **picco** di sviluppo delle **larve** e **diminuzione** del **volo** degli **adulti** e delle **ovideposizioni**. Inoltre il modello indica **inizio** della fase di **incrisalidamento**. Contestualizzare il dato di popolazione prevista dal modello con il corretto monitoraggio di campo.

PLANOCOCCO

LOCALITÀ 1 Schiamante - Varietà precoce


3° generazione - Popolazione presente (%)



Il modello **Agrigenius® Uva** pronostica per questa settimana l'**incremento** degli **adulti** e la **diminuzione** delle **forme giovanili** presenti.

LOCALITÀ 2: Lipruni - Varietà precoce


PERONOSPORA



Per la settimana in oggetto il modello **Agrigenius® Uva** non prevede alcun rischio infettivo. Prestare attenzione alle eventuali bagnature mattutine che possono avviare cicli infettivi.

LOCALITÀ 2: Lipruni - Varietà precoce

OIDIO



Il DSS **Agrigenius® Uva**, per la settimana in oggetto, prevede rischio **basso** di infezioni secondarie.


OIDIO

Nel periodo considerato il livello di **pressione infettiva** è attenuato per quanto riguarda i **grappoli** mentre per gli **organi verdi**, compreso il **rachide**, si mantiene su valori medio-alti.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 2: Lipruni - Varietà precoce

BOTRITE




Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** non indica alcun rischio di infezioni.

TIGNOLETTA

LOCALITÀ 2 Lipruni - Varietà precoce

3° generazione - Popolazione presente (%)




Per la settimana in oggetto il **DSS Agrigenius® Uva** indica il raggiungimento del **picco** di sviluppo delle **larve** e **diminuzione** del **volo** degli **adulti** e delle **ovideposizioni**. Inoltre il modello indica **inizio** della fase di **incrisalidamento**. Contestualizzare il dato di popolazione prevista dal modello con il corretto monitoraggio di campo.

PLANOCOCCO

LOCALITÀ 2 Lipruni - Varietà precoce


3° generazione - Popolazione presente (%)



Il modello **Agrigenius® Uva** pronostica per questa settimana l'**incremento** degli **adulti** e la **diminuzione** delle **forme giovanili** presenti.

LOCALITÀ 3: Incoronata - Varietà tardiva


PERONOSPORA



Per la settimana in oggetto il modello **Agrigenius® Uva** non prevede alcun rischio infettivo. Prestare attenzione alle eventuali bagnature mattutine che possono avviare cicli infettivi.

LOCALITÀ 3: Incoronata - Varietà tardiva

OIDIO



Il DSS **Agrigenius® Uva**, per la settimana in oggetto, prevede rischio **medio** di **infezioni secondarie**. Tale rischio è riferito principalmente al **rachide** e agli **organi verdi**; le bacche hanno perso la suscettibilità al patogeno dall'invaiaatura.


OIDIO

Nel periodo considerato il livello di **pressione infettiva** è **medio** per i **grappoli** ma si mantiene su valori **alti** per tutti gli **organi verdi**, compreso il **rachide**.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 3: Incoronata - Varietà tardiva

BOTRITE




Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** non indica alcun rischio di infezioni.

TIGNOLETTA

LOCALITÀ 3 Incoronata - Varietà tardiva

3° generazione - Popolazione presente (%)




Per la settimana in oggetto il modello previsionale indica **raggiungimento del picco** di sviluppo delle **larve** e **diminuzione** del **volo** degli **adulti** e delle **ovideposizioni**. Contestualizzare il dato di popolazione prevista dal modello con il corretto monitoraggio di campo.

PLANOCOCCO

LOCALITÀ 3 Incoronata - Varietà tardiva

3° generazione - Popolazione presente (%)



Il modello **Agrigenius® Uva** pronostica per questa settimana l'**incremento** degli **adulti** e la **diminuzione** delle **forme giovanili** presenti.

BASF
We create chemistry

Agrigenius®
Uva

Il DSS che monitora costantemente le condizioni in campo e fornisce allerte e consigli operativi

Internal