



BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 4

Periodo: 01/09 – 07/09

Fase fenologica attuale (vite da tavola):

Fenofase: (BBCH 91 PRECOCI) - (BBCH 85 - 89 TARDIVE)

Elaborazione su base DSS *Agrigenius® Uva* (BASF)

A cura dell'Ufficio Tecnico Agriproject Group


FASE FENOLOGICA

									
Apertura gemme	Foglie distese	Grappoli separati	Bottoni fiorali separati	Fioritura	Allegagione	Pre chiusura grappolo	Chiusura grappolo	Maturazione acini	Raccolta

VARIETA' PRECOCI										
VARIETA' TARDIVE										

ZONE E VARIETA' DI RIFERIMENTO

- **Stazione meteo 1**
Località «Schiamante»
NOTA: 1.5 km dal mare
Varietà: precoce
- **Stazione meteo 2**
Località «Incoronata»
NOTA: 3.2 km dal mare
Varietà: precoce
- **Stazione meteo 3**
Località «Lipruni»
NOTA: 9.2 km dal mare
Varietà: tardiva



SITUAZIONE COMPLESSIVA

PERONOSPORA (*Plasmopara viticola*)

Per questa settimana, il modello Agrigenius® Uva non pronostica nessun rischio infettivo.

OIDIO (*Erysiphe necator*)

Per la settimana in oggetto il DSS prevede rischio infettivo medio di infezioni secondarie sia per l'areale precoce che per quello tardivo. Tale rischio riguarda principalmente il rachide e gli organi verdi mentre per le bacche la suscettibilità è decaduta dal momento dell'invasatura. Il consiglio tecnico rimane sempre quello di valutare le condizioni meteorologiche, le caratteristiche specifiche del proprio vigneto e della zona tenendo conto che le condizioni microclimatiche che si vengono a creare nei vigneti coperti, con un'elevata umidità relativa e un'elevata escursione termica dì/notte rappresentano un ambiente ottimale per lo sviluppo del fungo.

BOTRITE (*Botrytis cinerea*)

Al momento il modello Agrigenius® Uva non prevede nessun rischio infettivo sia per l'areale precoce che per quello tardivo.

SITUAZIONE COMPLESSIVA

TIGNOLETTA (*Lobesia botrana*)

Negli areali monitorati, precoci e tardivi, il modello indica superato il picco di presenza delle larve e pronostica la fine della terza generazione nota anche come seconda generazione carpofaga. Inoltre è previsto incremento della fase di incrisalidamento delle larve.

COCCINIGLIE (*Planococcus ficus*)

Nella settimana in oggetto, negli areali tardivi e precoci, il modello prevede l'incremento degli adulti e la diminuzione delle forme giovanili.

LOCALITÀ 1: Schiamante - Varietà precoce

OIDIO



Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** segnala rischio **medio** di **infezioni secondarie**. Tale rischio è riferito principalmente al **rachide** e agli **organi verdi**; le bacche hanno perso la suscettibilità al patogeno dall'invaiaatura.

OIDIO

Per il periodo considerato, nei vigneti di varietà precoci, il livello di **pressione infettiva** è **medio** a livello dei **grappoli maturi**. Il rischio non decade per gli **organi verdi**, compreso il **rachide**, per i quali la **pressione infettiva** si mantiene su livelli **medio-alti**.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 1: Schiamante - Varietà precoce

BOTRITE




Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** non segnala alcun **rischio infettivo**.

TIGNOLETTA

LOCALITÀ 1 Schiamante - Varietà precoce

3° generazione - Popolazione presente (%)




Per la settimana in oggetto il modello previsionale indica **terminata** la terza generazione del lepidottero. Il DSS inoltre prevede incremento della fase di **incrisalidamento** delle larve.

PLANOCOCCO

LOCALITÀ 1 Schiamante - Varietà precoce


3° generazione - Popolazione presente (%)



Il modello **Agrigenius® Uva** indica presenza di **adulti** di terza generazione.

LOCALITÀ 2: Incoronata - Varietà precoce


PERONOSPORA



Per la settimana in oggetto il modello **Agrigenius® Uva** non prevede alcun rischio infettivo.

LOCALITÀ 2: Incoronata - Varietà precoce

OIDIO




Il DSS **Agrigenius® Uva**, per la settimana in oggetto, prevede rischio **basso** di infezioni secondarie.


OIDIO

Nel periodo considerato il livello di **pressione infettiva** è attenuato per quanto riguarda i **grappoli** ormai maturi mentre per gli **organi verdi**, compreso il **rachide**, si mantiene su valori **medi**.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 2: Incoronata - Varietà precoce

BOTRITE




Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** non indica alcun rischio di infezioni.

TIGNOLETTA

LOCALITÀ 2 Incoronata - Varietà precoce

3° generazione - Popolazione presente (%)




Per la settimana in oggetto il **DSS Agrigenius® Uva** indica superato il **picco** di presenza delle **larve** e per questa settimana pronostica la **fine** della terza generazione del lepidottero. In parallelo si assiste all'incremento dell'**incrisalidamento** delle larve.

PLANOCOCCO

LOCALITÀ 2 Incoronata - Varietà precoce

3° generazione - Popolazione presente (%)



Il modello **Agrigenius® Uva** indica la presenza degli **adulti** di terza generazione.

LOCALITÀ 3: Lipruni - Varietà tardiva


PERONOSPORA



Per la settimana in oggetto il modello **Agrigenius® Uva** non prevede alcun rischio infettivo.

LOCALITÀ 3: Lipruni - Varietà tardiva

OIDIO



Il DSS **Agrigenius® Uva**, per la settimana in oggetto, prevede rischio **medio** di **infezioni secondarie** per la metà della settimana. Tale rischio è riferito principalmente al **rachide** e agli **organi verdi**; le bacche hanno perso la suscettibilità al patogeno dall'invaiaitura.

OIDIO

Nel periodo considerato il livello di **pressione infettiva** è **medio** per i **grappoli** ormai maturi ma si mantiene su valori **alti** per tutti gli **organi verdi**, compreso il **rachide**.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 3: Lipruni - Varietà tardiva

BOTRITE




Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** non indica alcun rischio di infezioni.

TIGNOLETTA

LOCALITÀ 3 Lipruni - Varietà tardiva

3° generazione - Popolazione presente (%)




Per la settimana in oggetto il modello previsionale indica superato il **picco** di presenza delle **larve** e per questa settimana pronostica la **fine** della terza generazione del lepidottero. In parallelo si assiste all'incremento dell'**incrisalidamento** delle larve.

PLANOCOCCO

LOCALITÀ 3 Lipruni - Varietà tardiva

3° generazione - Popolazione presente (%)



Il modello **Agrigenius® Uva** pronostica per questa settimana presenza di **adulti** di terza generazione.